

6 Que faut-il surveiller pendant le traitement par TERBINAFINE ?

En cas de survenue de :

- Baisse de l'appétit, douleur abdominales persistantes, nausées, vomissements, pleurs anormaux, fatigue inhabituelle
- Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de la peau
- Fièvre, angine, saignement notamment des gencives
- Éruption cutanée ou rougeur

Contactez rapidement votre médecin !

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant, votre pédiatre, votre pharmacien.

Terbinafine
Comprimés de 250 mg

Cette fiche appartient à :


.....

Cette fiche reprend les informations essentielles mais n'exclut pas la prise de connaissance de la notice du médicament.

1 À quoi sert la terbinafine ?

Ce médicament permet de détruire les champignons qui ont infecté ta peau et tes cheveux.

2 Quand et comment prendre le médicament ?



SOIT : tu l'avales avec un verre d'eau

SOIT : tu broies le comprimé. Si tu décides de le broyer, il faut **prendre tout de suite** le médicament.

Tu peux le mélanger avec une cuillère de compote ou de yaourt,

mais pas dans l'eau !!



Poids : kg

Dose prescrite : mg

Prendre le comprimé entier
(250 mg)

Couper le comprimé en 2 et prendre la moitié
(125 mg)

Couper le comprimé en 4 et prendre $\frac{1}{4}$
(62,5 mg)



1 fois par jour,
au même moment,
avec un repas.



3 Comment conserver la terbinafine ?



Ce médicament se conserve à température ambiante, dans son emballage, jusqu'à sa date de péremption.



4 Que faire en cas d'oubli d'une dose ? Ne pas doubler la dose !

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée, tu continues normalement ton traitement.

5 Quelles autres précautions prendre pendant mon traitement ?

- Bien mettre la crème en traitement local
- Coupe de cheveux courts
- Laver les draps, serviettes, ... à 60°C
- **Un bilan hépatique pourra être demandé avant et éventuellement au cours du traitement (non systématique)**
- Prévenir mon médecin/mon pharmacien que je prends ce médicament pour éviter des interactions avec un autre traitement !



6 Que faut-il surveiller pendant le traitement par ITRACONAZOLE ?

En cas de survenue de

- Baisse de l'appétit, douleur abdominales persistantes, nausées, vomissements, pleurs anormaux, fatigue inhabituelle
- Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de la peau

Contactez rapidement votre médecin !

Itraconazole
Solution buvable 10 mg/mL
*(existe aussi en gélule de
100 mg)*

Cette fiche appartient à :

.....

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant,
votre pédiatre, votre pharmacien.

Cette fiche reprend les informations essentielles mais n'exclut pas la prise de connaissance de la notice du médicament.

1 À quoi sert l'itraconazole ?

Ce médicament permet de détruire les champignons qui ont infecté ta peau et tes cheveux.

2 Comment prendre le médicament ?



- Mélange le flacon
- Prélève ___ mL (= ___ mg) de la solution buvable dans une seringue fournie par ton pharmacien (tu peux jeter le gobelet doseur fourni avec ton médicament)
- Garde la solution dans ta bouche (environ 20 s)
- Rince bien à l'eau la seringue une fois que tu as pris ton traitement pour la prochaine prise.

3 Quand prendre le médicament ?

1 fois par jour, au même moment,
à distance des repas.

Ne mange pas pendant au moins 1 h après la prise du médicament.



4 Comment conserver l'itraconazole ?

Ce médicament se conserve à température ambiante, dans son emballage, jusqu'à **1 mois** après son ouverture.

FLACON OUVERT LE :/...../.....



5 Que faire en cas d'oubli d'une dose ? Ne pas doubler la dose !

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée, tu continues normalement ton traitement le lendemain.



6 Quelles autres précautions prendre pendant mon traitement ?

- Bien mettre la crème en traitement local
- Coupe de cheveux courts
- Laver les draps, serviettes, ... à 60°C
- **Un bilan hépatique pourra être demandé avant et éventuellement au cours du traitement (non systématique)**
- **Prévenir mon médecin/mon pharmacien que je prends ce médicament pour éviter des avec un autre traitement !**

