

Identification du prescripteur

N° 60-3937

à _____, le ___/___/_____

**Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)**

Age : _____

Poids : _____

Veillez rayer les médicaments inutiles et entourer les posologies prescrites

1) **IVERMECTINE 3mg, comprimés (STROMEKTOL)** : _____ comprimé(s)

200µg/kg par prise, soit 1 cp (3 mg) pour 15kg de poids, au cours du repas (meilleure absorption)

15 -24kg : 1cp	25-35kg : 2cp	36-50cp : 3 cp	51-65kg : 4cp	66-79kg : 5 cp	>= 80kg : 6cp
----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

- Pour les enfants de moins de 15kg : couper le cp en 2 ou 4, avant de l'écraser et de le diluer dans de l'eau.
 - o De 7,5 à 15kg : ½ cp.
 - o De 3,75 à 7,5kg: ¼ cp

A renouveler 1 fois entre J8-J14

2) **BENZOATE DE BENZYLE (ASCABIOL® 10%), émulsion cutanée** : _____ flacon(s) de 125mL

2 badigeons successifs à 10-15 minutes. Laisser poser 24h puis rincer.

- Chez la femme enceinte : 1 seul badigeon
- Enfant <2 ans : 1 seul badigeon à laisser poser 12h.
- Enfant <1 an : 1 seul badigeon à laisser poser 6h

A renouveler 1 fois entre J8-J14, selon les mêmes modalités

3) **PERMETHRINE crème 5% (TOPISCAB), tube de 30g** : _____ tube(s)

1 couche fine le soir. Laisser poser toute la nuit (> 8h) et rincer le matin

Adapter la quantité de crème et le nombre de tubes selon la surface corporelle (quantité à titre indicatif)

2 mois-1 ans : 1/8 de tube	1-5 ans : ¼ tube	6-12 ans : ½ tube	Adulte et plus de 12 ans : 1-2 tube(s) de 30g
----------------------------	------------------	-------------------	---

A renouveler 1 fois entre J8-J14, selon les mêmes modalités

Ne pas oublier de décontaminer le linge et la literie, ni de traiter simultanément de tous les sujets contacts