

Hidradénite suppurée

Aide à la prise en charge

1. Diagnostic (3 critères présents)

- Présence de nodules
- Localisation typique (aires axillaire, inguinale, périnéale, plis mammaires)
- Lésions chronique et récidivantes

2. Antécédents personnel / familiaux :

- Tabac
- Kyste pilonidal
- Acné majeure
- Cellulite disséquante vertex
- Maladie de Crohn
- Spondylarthropathie
- PASH / PAPASH
- Syndrome des ovaires polykystiques
- Hirsutisme
- Verneuil (nombre dans la famille) :

3. Examen clinique :

Taille : Cm Poids : Kg
Année de début : Année de diagnostic :

Zones atteintes	Abcès / nodules (nbr)	Cicatrices (nbr)	Fistulisation (nbr)	Autres (comédons, folliculite) (nbr)	Hurley (stade)
Axillaire					
Sous mammaire					
Inguinal					
Périnéal					
Inter-fessier					
Nuque					
Cuir chevelu					
Rétro-auriculaire					
Visage					
Pretragien					
Dos					
Thorax					

4. Forme clinique :

- LC1 Axillo-mammaire (région typique, nodules, cicatrices en pont, femme, obèse)
- LC2 Folliculaire (région typique et atypique, folliculite, kystes, comédons, cicatrices en pic à glace, tabagisme, évolution sévère)
- LC3 Gluteal (région glutéale, abcès, folliculite, tabagisme, non obèse)

5. Evaluation de la sévérité de la maladie :

Stade de Hurley (le plus grave) :
Sartorius modifié :
EVA (de 0 à 10) :
DLQI :

6. Recherche de comorbidité

- Cancer cutané
- Dépression (échelle MADRS)
- Risque cardio vasculaire
- Tabac / Surpoids

7. Traitements : OUI / NON / en cours (à détailler)

Sevrage du tabac Hygiène alimentaire et sportive Antalgique Palier 1, Palier 2, Palier 3 Antiseptique en topique Erythromycine en topique Clindamycine en topique Doxycycline 100mg/j Cotrimoxazole 400/80 mg/j Amoxicilline-acide clavulanique 7j si poussée Pristinamycine 7j si poussée	Rifampicine 600 mg/j + Clindamycine 600 mg/j Ofloxacine 400 mg/j + Clindamycine 600 mg/j Levofloxacine 500 mg x 2/j + Clindamycine 600 mg x 3/j Anti androgène (acétate de cyproterone + oestradiol) Oestroprogestatif 2ème ou 3ème génération Metformine Isotretinoïne 0,5mg/kg	Zinc 90mg/j Caisson hyperbare Incision, drainage d'abcès Derroofing STEEP* Chirurgie limitée Chirurgie large Laser yag long pulse Lumière pulsée Cephalosporine IV + metronidazole 500mgx3 Infliximab Adalimumab
---	--	---