

ANNEXE 8. LISTE DES ANTI-HISTAMINIQUES H1 AVEC AMM DANS L'URTICAIRE

DÉNOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE	NOM COMMERCIAL (EXEMPLES)	ÂGE	DEMI-VIE	ADAPTATION POSOLOGIQUE ^a	RISQUE DE TORSADES DE POINTE ^b
PREMIÈRE GÉNÉRATION					
BROPHENIRAMINE	Dimegan®	≥ 12 ans	25h	IR IH	-
CYPROHEPTADINE	Periactine®	≥ 6 ans	10-15h	IR	-
DEXCHLORPHENIRAMINE	Polaramine®	≥ 6 ans	14-25h	IR IH	+
HYDROXYZINE	Atarax®	≥ 30 mois	11-20h 4h (enfant)	IR IH Sujet âgé	+++
MEQUITAZINE	Primalan®	≥ 6 ans	18h	IH	+++
PROMETHAZINE	Phénergan®	Adulte	10-15h	IR IH	+++
SECONDE GÉNÉRATION					
BILASTINE	Bilaska® Inorial®	≥ 12 ans	14,5h	IR	++
CETIRIZINE	Zyrtec® Virlix® Zyrtecset®	≥ 2 ans	10h	IR (si cl<80 ml/min) Sujet âgé	-
DESLORATADINE	Aerius® Dasselta®	≥ 1 an	27h	IR Sujet âgé	+
EBASTINE	Kestin®	≥ 12 ans	15-19h	IR	++
FEXOFENADINE	Telfast®	≥ 12 ans	11-15h	IR	+
LEVOCETIRIZINE	Xyzall®	≥ 6 ans	7,9h	IR (si cl<80 ml/min) IH sujet âgé	-
LORATADINE	Clarityne® ^c	≥ 6 ans	8,4h	IH sujet âgé	-
MIZOLASTINE	Mizollen®	≥ 12 ans	13h	IH	++
RUPATADINE	Wystamm® ^d	≥ 12 ans	5,9h	IR IH	+

^a= adaptation posologique en cas : IR = d'insuffisance rénale (cl< 60 ml/min) ; IH = d'insuffisance hépatique

^b= torsades de pointe : +++= risque avéré majeur; ++ = risque faible ; + = risque suspecté ; - = pas de risque à ce jour

^c= arrêt de commercialisation prochaine de la forme sirop (l'âge minimum passera de 2 à 6 ans) (source : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)

^d= arrêt de commercialisation prochaine de la forme sirop (l'âge minimum passera de 2 à 12 ans) (source : base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)